

Verhalten nach parodontalchirurgischen Eingriffen

Sehr geehrter Patient,

um den Erfolg der bei Ihnen durchgeführten Implantation nicht zu gefährden, möchten wir Sie bitten, diese Verhaltenshinweise zu befolgen:

Direkt nach dem Eingriff:

- Essen und trinken Sie erst wieder, wenn Sie das vollständige Gefühl im Operationsgebiet wiedererlangt haben.
- Trinken Sie heute und morgen keinen Kaffee, Schwarztee oder koffeinhaltigen Getränke und keinen Alkohol.

In der ersten Woche:

- Vermeiden Sie starke körperliche Anstrengungen und sportliche Aktivitäten.
- Rauchen Sie nicht!
- Benutzen Sie im Bereich der Implantation keine Munddusche, Zahnbürste oder Zwischenraumbürsten.
- Nehmen Sie die ggf. von uns verschriebenen Antibiotika regelmäßig gemäß der Verordnung ein.
- Spülen Sie den Mund 2 x täglich für 60 Sekunden mit der von uns verschriebenen antibakteriellen Mundspüllösung.
- Kauen Sie möglichst nicht im Bereich der Implantation, vermeiden Sie harte, körnige Speisen.
- Spülen Sie den Mund nach jeder Nahrungsaufnahme mit etwas Wasser aus.
- Sofern Sie im Bereich der Implantation einen derzeit einen herausnehmbaren Zahnersatz tragen, wird dieser von uns entsprechend angepasst. Tragen Sie diesen Ersatz bitte nur tagsüber.
- Bei Schmerzen, insbesondere klopfender Art, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel: (0221) 949 876 54

Wir wünschen Ihnen rasche Genesung

Ihre Zahnarztpraxis
Dr.med.dent. Meinhardt & Jansen